

УДК 681.3.069

В.Поляков (гр. 1023/1), С.Б.Тихвинский, д.м.н., проф.

СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) КАК ПРОБЛЕМА XX-XXI ВЕКОВ

Первые случаи СПИД были зарегистрированы летом 1981 года в США. Сообщалось, что у нескольких молодых людей с ослабленным иммунитетом, оказавшихся гомосексуалистами, обнаружена саркома Капоши и воспаление легкого. Хотя клиника иммунодефицита к тому времени была известна, причина и пути заражения представлялись неясными до открытия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в 1983 году. Как и для любого заболевания, для СПИД характерно наличие людей, составляющих группу риска. До недавнего времени в нее входили в основном гомосексуалисты, наркоманы, вводящие наркотик внутривенно, гемофилики, пользующиеся заменителями крови, проститутки, лица, которым переливалась кровь. Теперь в нее входят лица, имеющие большое количество половых партнеров, беспорядочные связи и т.д. Заражение происходит половым путем, парентерально, при гемотрансфузии, трансплацентарно и с молоком матери.

По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в конце 1991 года в 163 странах было зарегистрировано 418404 случая заболевания среди 5-10 миллионов инфицированных лиц, более половины из них на американском континенте. В России зарегистрировано 668668 инфицированных и 70 больных, в том числе 42 ребенка. Из них более половины погибло. Согласно данным ВОЗ в 2000 году вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) были заражены от 30 до 40 миллионов человек, причем более 90% из них в высокоразвитых странах. ВОЗ предсказывает еще более высокий рост заболеваемости, особенно в странах Юго-Восточной Азии и Африки. Таким образом, необходимость активных профилактических мер не вызывает сомнений.